

Pourquoi réalise-t-on cette intervention?

Un cathéter central inséré par voie périphérique (CCIP) est un long tube flexible que l'on insère dans une grosse veine dans la partie supérieure du bras. L'extrémité du CCIP repose dans les grands vaisseaux sanguins menant au cœur où l'important volume de flux sanguin réduit les dommages aux veines. Le personnel infirmier spécialement formé se charge d'insérer le CCIP au moyen d'une technique stérile. On vérifie que le CCIP est bien au bon endroit avant de l'utiliser. S'il est correctement entretenu, le CCIP peut rester dans votre corps aussi longtemps que vous en aurez besoin pour vos traitements. Disposer d'un CCIP peut permettre un congé plus rapide de l'hôpital ainsi que le traitement en milieu communautaire. Les CCIP servent :

- à l'administration de liquides ou de médicaments par voie intraveineuse pendant plus de deux semaines;
- à l'administration de médicaments par voie intraveineuse lorsque les veines des bras sont très difficiles à trouver;
- au prélèvement de sang pour les tests;
- à vous donner du sang.

Utilisation, soin et entretien du CCIP :

Seuls les fournisseurs de soins de santé ayant suivi une formation en usage, soin et entretien approprié du CCIP devraient y avoir accès. Une mauvaise utilisation du CCIP peut entraîner plusieurs complications indésirables, notamment : l'infection, la formation de caillots, les dommages aux nerfs ou une embolie gazeuse.

- Éviter de vérifier la pression artérielle, de faire des mouvements répétitifs ou de soulever des charges supérieures à 6,8 à 9 kg (15 à 20 lb) avec le bras où se trouve le CCIP.
- Garder le CCIP sec et propre. Le couvrir en prenant une douche.
- Changer le pansement du CCIP le lendemain et une fois par semaine par la suite, ou au besoin. Demander au personnel infirmier de changer le pansement pour garantir que le site d'insertion du CCIP est bien sec avant de le couvrir dans le but d'éviter les complications.
- Le site d'insertion du CCIP peut être douloureux pendant les 12 prochaines heures; il s'agit d'un effet secondaire commun.
- Soins à domicile et en milieu communautaire (SDMC) – 1-888-721-2222

Pour toute question sur le CCIP qui ne relève pas d'une urgence, veuillez communiquer avec :

Téléphone : 705-526-1300 poste 5248

Courriel : CCIPservice@gbgh.on.ca

Heures de bureau : du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h

Pour toute complication, veuillez vous rendre au service des urgences le plus proche.

Quand faut-il obtenir des soins médicaux d'urgence?

- Signes d'infection y compris des frissons ou une fièvre de 38 °C ou plus (100,4 °F).
- Essoufflement soudain ou douleur thoracique soudaine.
- Le CCIP est partiellement ou entièrement retiré. S'il est partiellement sorti, ne pas le réinsérer. S'il est entièrement sorti, couvrir le site avec un pansement. Ne pas jeter le CCIP. Le fournisseur de soins de santé doit le vérifier.
- Incapable d'irriguer le CCIP ou le personnel infirmier ne peut pas en prélever du sang.
- Il y a une fuite dans le CCIP.
- Vous avez perdu les bouchons du CCIP.
- Vous entendez un son de « rinçage » lors de l'irrigation du CCIP.
- Vous ressentez une accélération du rythme cardiaque ou le cœur saute des battements.
- Gonflement de la main, des doigts, du cou ou de la partie supérieure du bras.
- Vous ressentez de la douleur, de l'engourdissement ou des picotements continus dans le bras, les mains ou les doigts du bras où se trouve le CCIP.
- Vous avez des rougeurs, de la chaleur ou la peau est dure et surélevée au site d'insertion du CCIP ou sur le bras où se trouve le CCIP.
- En cas d'urgence, appeler le 911 immédiatement.