

CPRE

Cholangiopancreatographie rétrograde endoscopique (CPRE) Directives et renseignements sur le congé

Une CPRE peut engendrer les effets secondaires suivants :

- mal de gorge
- enrouement de la voix
- Toux sèche

Il s'agit de symptômes temporaires qui cesseront en un jour ou deux. Pour soulager les maux, utilisez des pastilles pour la gorge ou rincez-vous la bouche avec de l'eau salée.

Vous avez reçu un sédatif et devez suivre ces interdictions :

- Ne pas boire de boissons alcoolisées, utiliser le cannabis ou prendre d'autres sédatifs.
- Ne pas conduire de véhicule motorisé.
- Ne pas faire fonctionner de la machinerie ou des outils électriques.
- Ne pas prendre d'importantes décisions juridiques ou financières.

Veillez n'effectuer aucune de ces activités dans les 24 premières heures suivant votre intervention chirurgicale. Nous vous suggérons de retourner à la maison et de vous reposer le reste de la journée. Après la sédation, nous vous recommandons d'être surveillé par un adulte pour garantir votre sécurité à la maison.

Directives supplémentaires :

- Ne rien manger ni boire pendant une heure après l'intervention.
- Reprendre progressivement un régime alimentaire léger à normal, en fonction de ce que vous ressentez.

Si vous éprouvez l'un des symptômes suivants, retournez à la salle d'urgence la plus proche ou signalez le 911 :

- saignements importants (dans les selles ou les vomissements)
- émission de selles foncées dans les 14 jours suivants
- fièvre ou frissons
- vomissements
- difficulté à avaler
- importantes douleurs abdominales ou ballonnements qui ne s'améliorent pas en quelques heures.
- douleur à la poitrine
- difficulté à respirer